EMC
HGE

Les causes rares d'hémorragie digestive haute

Gilles Lesur

Fédération des Spécialités Digestives

Hôpital Ambroise Paré

92104 Boulogne

ENDOSCOPIE HAUTE EN URGENCE

```
graph TD; A[ENDOSCOPIE HAUTE EN URGENCE] --> B[Causes fréquentes (80 %)]; A --> C[Causes rares (10%)]; A --> D[Endoscopie sans diagnostic (10%)];
```

Causes fréquentes (80 %)

ulcère (30%)
HTP (20%)
érosions diverses (20%)
œsophagite (10%)

Causes rares (10%)

Mallory-Weiss
Dieulafoy
anomalies vasculaires
fistules vasculo-digestives
causes biliaires et pancréatiques
...

Endoscopie sans diagnostic (10%)

PLAN

- **Mallory-Weiss**
- **Dieulafoy**
- **Anomalies vasculaires**

- **Fistules aorto-digestives**

- **Endoscopie initiale non diagnostique**

⇒ **Que faire ?**

- ⇒ **Les reconnaître**
- ⇒ **Les moyens d'investigations**
- ⇒ **Indications thérapeutiques**

LE MALLORY-WEISS

- **5 %** des hémorragies hautes
- **Hommes, âge moyen**, souvent alcooliques
- Séquence vomissements puis hématomèse inconstante
- Endoscopie : ulcération **unique** de la jonction (90 %)
- Hémorragie **active** = **20 %** (8/10 saignement diffus)

MALLORY-WEISS

L'HEMOSTASE ENDOSCOPIQUE ARRETE L'HEMORRAGIE

LE TRAITEMENT ENDOSCOPIQUE EST PLUS EFFICACE QUE LE TRAITEMENT MEDICAL

Avant adrénaline

Après adrénaline

TRAITEMENT ENDOSCOPIQUE DU MALLORY-WEISS

- **Injections, clips, ligature élastique**
- **Petites quantités d'adrénaline (< 5 ml)**
- **Indications : hémorragie active + vaisseau visible non hémorragique**
- **Résultats : hémostase définitive 95 %**
- **Complications du traitement endoscopique exceptionnelles**
- **IPP à fortes doses**

LE DIEULAFOY

- **2 %** des hémorragies hautes
 - **Hommes, âgés > 60 ans**
 - **Souvent abondante, avec parfois rectorragies**
 - **Saignement actif = 50 % des cas**
 - **Suintement diffus > micro pulsatile > en jet**
-

LOCALISATIONS DIGESTIVES DIEULAFOY

Lee. GIE 2003 ; 58 : 236

LOCALISATIONS GASTRIQUES DIEULAFOY

LOCALISATIONS DUODENALES DIEULAFOY

ASPECTS ENDOSCOPIQUES DE DIEULAFOY

LE DIAGNOSTIC DU DIEULAFOY EST DIFFICILE

- **Il repose sur la constatation * :**
 - **soit** d'un saignement actif
 - **soit** d'un vaisseau visible **saillant**, avec ou sans saignement actif
 - **soit** d'un caillot adhérent
 - provenant d'une ulcération superficielle de moins de 3 mm de diamètre ou d'une muqueuse normale

- **Il peut être aidé d'une :**
 - **échoendoscopie**
 - **TDM**

Dr
Palazzo

* Gostout. Am J Gastroenterol 1995

L'HEMOSTASE MECANIQUE EST PLUS EFFICACE QUE LES INJECTIONS

LES CLIPS ET LA LIGATURE ONT UNE EFFICACITE EQUIVALENTE

PRISE EN CHARGE DU DIEULAFOY

- Hémostase **mécanique** ± adrénaline
- Indications **larges** car saignement intermittent :
 - hémorragie active
 - vaisseau visible non hémorragique
 - caillot adhérent
- Hémostase initiale = 90 %
- Récidive hémorragique précoce = 10% si hémostase mécanique
- IPP à fortes doses

QUELLE METHODE CHOISIR ?

	efficacité	commodité	morbidité
Clips	+++	++	0
Injections	+	+++	0
Méthodes thermiques	++	+++	+
Ligature	+++	+	+

DIEULAFOY FUNDIQUE TRAITÉ PAR CLIPS

Yamaguchi. GIE 2003 ; 57 : 653-6

ANOMALIES VASCULAIRES

3 % des hémorragies hautes

- **Acquises et dégénératives**
 - **angiodysplasies**
 - **télangiectasies**
 - **angiomes**
 - **ectasies vasculaires antrales**

MALFORMATIONS VASCULAIRES ACQUISES

Prévalence **1 à 2 %** et **25 %** en cas d'hémorragie digestive

Hémorragies non sévères

Hémorragies **actives = 10%** (suintement diffus)

Estomac > bulbe > duodénum

Plusieurs niveaux du tube digestif **50 %**

Association : néphropathie, cirrhose, troubles de la coagulation,...

ASPECTS ENDOSCOPIQUES

tache rouge, ovale
petite taille
souvent plane
halo périphérique clair
groupées en bouquet

ECTASIES VASCULAIRES ANTRALES

Type I : aspect stries radiaires

Plus fréquent en l'absence de cirrhose

Type II : aspect diffus

En cas de cirrhose

Dans les 2 cas, anémie >> hémorragies

LE TRAITEMENT MEDICAL EST INEFFICACE

Probabilité actuarielle d'être indemne de saignement

Junquera. Gastroenterology 2001 ; 121 :1073

LE TRAITEMENT ENDOSCOPIQUE EST EFFICACE

- **Coagulation au plasma argon**
 - **Indications : MVA hémorragique**
 - hémorragie active
 - MVA + sang ou anémie + pas d'autre cause
 - **Début précoce du traitement dès le diagnostic fait**
 - **Pas de traitement des MVA asymptomatiques**
 - **Complications 2 - 5 %**
 - **Résultats MVA > EVA > Rendu-Osler**

RESULTATS DE LA COAGULATION AU PLASMA

ARGON DANS LES MVA

Probabilité d'être indemne de récurrence hémorragique

86 % à un an / 80 % à 2 ans

FISTULES AORTO-DUODENALES

- **< 1%** des hémorragies hautes
- **80 %** aorto-duodénales après chirurgie aortique (incidence 1 %)
- **80%** **duodénum distal**
- **Délai** de survenue très variable mais souvent de plusieurs années
- **80 %** révélées par une **hémorragie digestive massive**
- **Diagnostic = endoscopie et/ou TDM**
- **Pronostic = précocité du diagnostic**

FISTULES AORTO-DUODENALES

ENDOSCOPIE INITIALE

Causes fréquentes (80%)

**Causes rares
(10%)**

ENDOSCOPIE SANS DIAGNOSTIC (10%)

Hémorragie active

Hémorragie non abondante et interrompue

Nouvelle endoscopie

Selon clinique

EN PRESENCE D'UN LAC MUQUEUX SANGLANT

Stollman. GIE 1997 ; 46 : 324

N = 61 (13%)

(VO 29, ulcère 12, gastropathie HTP 5, Mallory-Weiss 5, UD 5, VG 4, Dieulafoy 2, autres 7)

nouvelle endoscopie n=32

gastropathie HTP 8

ulcère gastrique 2

varices gastriques 2

tumeur stromale 1

EN PRESENCE D'UNE HEMORRAGIE ACTIVE

- **Refaire l'examen** dans de meilleures conditions : érythromycine, opérateur, anesthésie

- **Se méfier ++ :**
 - lésions **ulcéreuses** de localisation difficile : partie haute PC, anastomose, jonction D1-D2
 - **Dieulafoy**
 - **fistule (si sang dans le duodénum)**

- **Discuter TDM** et/ou artériographie

CONCLUSIONS

Une endoscopie initiale **d'emblée** dans de bonnes conditions doit permettre le diagnostic et le traitement

Le geste hémostatique doit être adapté à la **cause** de l'hémorragie

En cas d'échec initial, une **2^o endoscopie** doit être réalisée dès que possible

Une récurrence hémorragique est le plus souvent accessible à un **second geste hémostatique**

EMC
HGE