Sophie HILLAIRE

Maladies des vaisseaux du foie en dehors des thromboses des gros vaisseaux

- Savoir évoquer une maladie vasculaire du foie.
- Savoir le prouver.
- Connaître les implications thérapeutiques et pronostiques d'un tel diagnostic.

Les maladies des vaisseaux du foie en dehors des thromboses des gros vaisseaux (Les atteintes primitives)

Dr S. Hillaire*, Dr D. Cazals-Hatem, Pr D. Valla*****

***Réseau Val de Seine, Hôpital Foch, 92150 Suresnes**

****Service d'anatomopathologie, Hôpital Beaujon, 92118 Clichy**

*****Service d'hépatologie, Hôpital Beaujon, 92118 Clichy**

Anomalies de la Microcirculation hépatique

Anomalies de Perfusion hépatique

Anomalies De l'architecture hépatique

Plan

Les lésions histologiques

Le diagnostic

Les complications et les traitements

Les lésions histologiques

Sinusoidales

Syndrome d'obstruction sinusoidal

Dilatation sinusoidale et Péliose

Fibrose sinusoidale

Veinules portes

Veinopathie portale oblitérante

Modifications architecturales

Sclérose hépatoportale

Hyperplasie nodulaire régénérative

**Syndrome d'obstruction
sinusoïdal
Ex maladie veino-occlusive**

**Lésions des
Cellules endothéliales**

**Syndrome d'obstruction
sinusoïdal
Maladie veino-occlusive**

TOXIQUES

Alcaloïdes de la pyrrolizidine

Conditionnement avant greffe de moelle osseuse

Chimiothérapie (oxaliplatine, ...)

Irradiation,

Obstruction des sinusoides par des cellules tumorales ou substances amorphes

**Dilatation sinusoidale
Pélioïse**

**Atteintes sinusoidales
(cellules endothéliales,
cellules étoilées)**

Dilatation sinusoidale Pélioïse

Prise d'un toxique

Azathioprine,
Hormones:
pilule, androgènes,

Pathologie inflammatoire

Sepsis sévère (tuberculose,
abcès profonds...)
Pathologies inflammatoires
(Crohn, sclérodermie, ...)
Affections thrombogènes (SPL,...)

Fibrose périsinusoidale

Alcool, NASH,
diabète,
intoxication par la vitamine A

Les lésions histologiques

Sinusoïdales

Syndrome d'obstruction sinusoidal

Dilatation sinusoidale et Péliose

Fibrose sinusoidale

Veinules portes

Veinopathie portale oblitérante

Modifications architecturales

Sclérose hépatoportale

Hyperplasie nodulaire régénérative

Veinules portes

**Bilharziose,
Sarcoïdose,
CBP
Hépatite active
Infection chronique
des voies biliaires...**

**Syndrome myéloprolifératif
Thrombophilies
Syndrome des APL...**

Veinules portes

**Veinopathie
Portale
oblitérante**

Sclérose hépatoportale

Hyperplasie nodulaire régénérative

Défaut de perfusion localisé
Atrophie parenchymateuse localisée
Régénération hépatocytaire compensatrice
Pas de fibrose

Plan

Les lésions histologiques

Le diagnostic

Les complications et les traitements

**Anomalies isolées
du bilan hépatique**

**Hypertension portale
Intrahépatique
Non cirrhotique**

Anomalies de

Biopsie hépatique

de l'architecture hépatique

**Thrombose portale aigue
Dysmorphie hépatique**

Diagnostic histologique

**Larges fragments
Non sous capsulaires**

Biopsie transpariétale

Bilan étiologique

Quelles que soient les atteintes de la microcirculation,
ou de l'architecture hépatique,
ou la présentation clinique

Syndrome myéloprolifératif

culture de moelle, mutation JAK2 : 26 %

Autoimmunité

Autoanticorps 12 %,

Hypergamma-globulinémie 26 %

Antiphospholipides 13 %

Autres affections prothrombotiques 26 %

Etats prothrombotiques et anomalies de la microcirculation hépatique

	Observé	Attendu
	%	%
Un état prothrombotique, au moins	56.0	< 20.0
Combinaison d'états prothrombotiques	13.0	0.5

Complications et traitement

Hypertension portale

Thrombose portale

Insuffisance hépatocellulaire

Macronodules de régénération? CHC?

Suivi annuel

Endoscopie OGD

Recherche de grosses varices oesophagiennes

Echographie Doppler abdominale

Thrombose porte

Nodules hépatiques

Signes biologiques d'IHC et HTP

Conclusion

Les atteintes de la microcirculation hépatique

Isolées ou associées entre elles

Associées ou non à des anomalies de l'architecture hépatique

Leur diagnostic est histologique

Elles se manifestent par des anomalies isolées du bilan hépatique ou par une hypertension portale sans IHC

Les principales causes sont la prise de xénobiotiques ou d'hormones, les maladies de système ou les thrombophilies

FMCHGE